

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU



w obszarze zagrożonym wysoce zjadliwą grypą ptaków

należy:

- 1. Minimalizować kontakt drobiu z dzikim ptactwem.**
- 2. Nie wprowadzać ani nie wyprowadzać drobiu jaj z gospodarstwa bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu;**
- 2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;**
- 3. Zakupić środki dezynfekcyjne i używać ich do dezynfekcji sprzętu wykorzystywanego przy obsłudze drobiu;**
- 4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- 5. Zgłaszać powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsca utrzymywania drobiu.**

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie lekarzom weterynarii prywatnej praktyki lub powiatowemu lekarzowi weterynarii podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność, znaczący spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezdolność ruchów, duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu

tel. 77 482 15 61

e-mail: grypa@kedzierzyn.net.pl

www.kedzierzyn.net.pl